

| | |
|----------|------------|
| 診療科・対象疾患 | 消化器内科・膵臓癌 |
| プロトコール名 | GS後発(2投1休) |
| 1コース日数 | 21日 |
| 催吐リスク分類 | 中等度 |

| 薬剤名 | 投与量 | day1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | | | | | |
|---------|-----------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ゲムシタビン注 | 1000mg/m ² | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S-1 | 下記参照 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

治療スケジュール
処方

デカドロン錠(4) 2錠 1日1回 朝食後(day2、3、9、10)
(必要時) デカドロン錠(4) 2錠 1日1回 朝(day4、11)

| S-1投与量 | 下記投与量を1日2回 | | |
|--------|-----------------------|---|----------------------|
| 体表面積 | 1.25m ² 未満 | 1.25m ² 以上1.5m ² 未満 | 1.5m ² 以上 |
| 1回投与量 | 30mg | 40mg | 50mg |

Day 1、8

