

|          |             |
|----------|-------------|
| 診療科・対象疾患 | 消化器内科・胆道癌   |
| プロトコール名  | GS(S-1隔日)療法 |
| 1コース日数   | 21日         |
| 催吐リスク分類  | 中等度         |

| 薬剤名     | 投与量      | day1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ゲムシタビン注 | 1000mg/㎡ | ●    |   |   |   |   |   |   | ● |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S-1     | 下記参照     | ●    |   | ● |   | ● |   | ● |   | ● |    | ●  |    | ●  |    | ●  |    | ●  |    | ●  |    | ●  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |          |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |

治療スケジュール  
処方

デカドロン錠(4) 2錠 1日1回 朝食後(day2、3、9、10)  
(必要時) デカドロン錠(4) 2錠 1日1回 朝(day4、11)

|        |            |               |        |
|--------|------------|---------------|--------|
| S-1投与量 | 下記投与量を1日2回 |               |        |
| 体表面積   | 1.25㎡未満    | 1.25㎡以上1.5㎡未満 | 1.5㎡以上 |
| 1回投与量  | 30mg       | 40mg          | 50mg   |

Day 1、8

