診療科・対象疾患	消化器内科・胆道癌
プロトコール名	GCS（GEM＋CDDP＋S-1：隔日）
1コース日数	14日
催吐リスク分類	中等度

薬剤名	投与量	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
シスプラチン注	25mg/㎡	●													
ゲムシタビン注	1000mg/㎡	●													
S-1	下記参照	●		●		●		●		●		●		●	

治療スケジュール

処方

イメンドカプセル（125）	1C	1日1回	朝（day1）
イメンドカプセル（80）	1C	1日1回	朝（day2、3）
グラニセトロン内服ゼリー（2）	1包	1日1回	朝（day1）
（必要時）デカドロン錠（4）	1錠	1日1回	朝（day2、3、4）

※イメンドカプセル125mg　1日1回抗がん剤投与開始1時間～1時間30分前
※グラニセトロン内服ゼリー2mg　1日1回抗がん剤投与開始1時間前

S-1投与量	下記投与量を1日2回		
体表面積	1.25㎡未満	1.25㎡以上1.5㎡未満	1.5㎡以上
1回投与量	40mg	50mg	60mg

Day1

フィジオ140 500mL → 1時間 500mL/h → デキサート注4.95mg（抗がん剤投与30分前までに側管静注） → 生食 250mL シスプラチン注 25mg/㎡ → 1時間 250mL/h → 5%糖液 100mL ゲムシタビン注 1000mg/㎡ → 30分 200mL/h → 終了

フィジオ140 500mL → 100分 300mL/h →