診療科・対象疾患	消化器内科・胆道癌
プロトコール名	イミフィンジ+GEM＋CDDP療法21d
1コース日数	21日
催吐リスク分類	中等度

薬剤名	投与量	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
イミフィンジ注	1500mg/body	●																											
シスプラチン注	25mg/㎡	●							●																				
ゲムシタビン注	1000mg/㎡	●							●																				

治療スケジュール

処方

アプレピタントカプセル（125）　1C　1日1回　朝（day1、8）
アプレピタントカプセル（80）　1C　1日1回　朝（day2、3、9、10）
グラニセトロン内服ゼリー（2）　1包　1日1回　朝（day1、8）
（必要時）デカドロン錠（4）　1錠　1日1回　朝（day2、3、4、9、10、11）

※アプレピタントカプセル125mg　1日1回抗がん剤投与開始1時間～1時間30分前
※グラニセトロン内服ゼリー2mg　1日1回抗がん剤投与開始1時間前
※最大8コース→その後イミフィンジ療法へ

Day1

生食 500mL（ルート確保用）
フィルター付ルート使用
→ 生食 100mL　イミフィンジ注 1500mg/body　1時間 100mL/h
→ 生食 50mL　15分 200mL/h
→ フィジオ140 500mL　1時間 500mL/h
→ デキサート注4.95mg（抗がん剤投与30分前までに側管静注）
→

フィジオ140 500mL　100分 300mL/h →

生食 250mL　シスプラチン注 25mg/㎡　1時間 250mL/h
→ 5%糖液 100mL　ゲムシタビン注 1000mg/㎡　30分 200mL/h
→ 終了

診療科・対象疾患	消化器内科・胆道癌
プロトコール名	イミフィンジ+GEM＋CDDP療法21d
1コース日数	21日
催吐リスク分類	中等度

薬剤名	投与量	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
イミフィンジ注	1500mg/body	●																											
シスプラチン注	25mg/㎡	●							●																				
ゲムシタビン注	1000mg/㎡	●							●																				

治療スケジュール

処方

アプレピタントカプセル（125）　1C　1日1回　朝（day1、8）
アプレピタントカプセル（80）　1C　1日1回　朝（day2、3、9、10）
グラニセトロン内服ゼリー（2）　1包　1日1回　朝（day1、8）
（必要時）デカドロン錠（4）　1錠　1日1回　朝（day2、3、4、9、10、11）

※アプレピタントカプセル125mg　1日1回抗がん剤投与開始1時間～1時間30分前
※グラニセトロン内服ゼリー2mg　1日1回抗がん剤投与開始1時間前
※最大8コース→その後イミフィンジ療法へ

Day8

フィジオ140 500mL → 1時間 500mL/h → デキサート注4.95mg（抗がん剤投与30分前までに側管静注） → 生食 250mL シスプラチン注 25mg/㎡ → 1時間 250mL/h → 5%糖液 100mL ゲムシタビン注 1000mg/㎡ → 30分 200mL/h → 終了

フィジオ140 500mL → 100分 300mL/h →