診療科・対象疾患	消化器内科・胆道癌
プロトコール名	キイトルーダ+GEM+CDDP療法21d
1コース日数	21日
催吐リスク分類	中等度

薬剤名	投与量	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
キイトルーダ注	200mg/body	●																											
シスプラチン注	25mg/㎡	●							●																				
ゲムシタビン注	1000mg/㎡	●							●																				

治療スケジュール

処方

アプレピタントカプセル（125）　1C　1日1回　朝（day1、8）
アプレピタントカプセル（80）　1C　1日1回　朝（day2、3、9、10）
グラニセトロン内服ゼリー（2）　1包　1日1回　朝（day1、8）
（必要時）デカドロン錠（4）　1錠　1日1回　朝（day2、3、4、9、10、11）

※アプレピタントカプセル125mg　1日1回抗がん剤投与開始1時間～1時間30分前
※グラニセトロン内服ゼリー2mg　1日1回抗がん剤投与開始1時間前
※最大8コース→その後キイトルーダ+GEM療法もしくはキイトルーダ療法へ

Day1

生食 500mL（ルート確保用）
フィルター付ルート使用
→ 生食 100mL キイトルーダ注 200mg/body
→（30分）生食 50mL
→（15分）フィジオ140 500mL
→（1時間）デキサート注4.95mg（抗がん剤投与30分前までに側管静注）
→

フィジオ140 500mL
→（100分）

生食 250mL シスプラチン注 25mg/㎡
→（1時間）5%糖液 100mL ゲムシタビン注 1000mg/㎡
→（30分）終了

診療科・対象疾患	消化器内科・胆道癌
プロトコール名	キイトルーダ+GEM+CDDP療法21d
1コース日数	21日
催吐リスク分類	中等度

薬剤名	投与量	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
キイトルーダ注	200mg/body	●																											
シスプラチン注	25mg/㎡	●							●																				
ゲムシタビン注	1000mg/㎡	●							●																				

治療スケジュール

処方

アプレピタントカプセル(125)　1C　1日1回　朝(day1、8)
アプレピタントカプセル(80)　1C　1日1回　朝(day2、3、9、10)
グラニセトロン内服ゼリー(2)　1包　1日1回　朝(day1、8)
(必要時) デカドロン錠(4)　1錠　1日1回　朝(day2、3、4、9、10、11)

※アプレピタントカプセル125mg　1日1回抗がん剤投与開始1時間～1時間30分前
※グラニセトロン内服ゼリー2mg　1日1回抗がん剤投与開始1時間前
※最大8コース→その後キイトルーダ+GEM療法もしくはキイトルーダ療法へ

Day8