| | |
|---|---|
| 診療科・対象疾患 | 消化器内科・膵臓癌 |
| プロトコール名 | mFOLFIRINOX（2週毎） |
| 1コース日数 | 14日 |
| 催吐リスク分類 | 高度 |

| 薬剤名 | 投与量 | day1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オキサリプラチン注 | 85mg/㎡ | ● | | | | | | | | | | | | | |
| イリノテカン注 | 150mg/㎡ | ● | | | | | | | | | | | | | |
| レボホリナート注 | 200mg/㎡ | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 5-FU注 持続点滴(46時間) | 2400mg/㎡ | ● | → | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

**治療スケジュール**

処方

デカドロン錠(4)　2錠　1日2回　朝昼（day2、3、4、必要時day5）
（必要時）オランザピン錠（2.5）　2錠　1日1回　夕（day1、2、3、4）

**※ 投与の際はドリップアイを使用**

**Day1**

生食 500mL
（ルート確保用）

→

パロノセトロン点滴
0.75mg
デキサート注9.9mg
アロカリス点滴静注
235mg

30分 →

生食 50mL

15分 →

5%糖液 250mL
オキサリプラチン注
85mg/㎡

2時間 →

5%糖液 250mL
イリノテカン注
150mg/㎡

5%糖液 250mL
レボホリナート注
200mg/㎡

90分 →
2時間

生食
5-FU注
2400mg/㎡

46時間 → 終了