診療科・対象疾患	呼吸器・乳腺外科・乳癌
プロトコール名	GEM(D1, 8)＋HER(初回:8mg/kg)21d
1コース日数	21日
催吐リスク分類	軽度

薬剤名	投与量	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
ゲムシタビン注	1250mg/㎡	●							●																				
トラスツズマブ注	8mg/kg	●																											

治療スケジュール

処方

※ トラスツズマブ注は投与予定日より1週間を超えて投与する際は改めて初回投与量で行う
※ トラスツズマブ注の溶解液量は60mgが3.0mL、150mgが7.2mL

Day1

生食 100mL
(ルート確保用)
→ 生食 250mL
トラスツズマブ注
8mg/kg
→ 90分※
167mL/h
→ 生食 100mL
デキサート注 6.6mg
→ 30分
200mL/h
→ 5%糖液 100mL
ゲムシタビン注
1250mg/㎡
→ 30分
200mL/h
→ 終了

※2回目以降、30分に変更可能

Day8

5%糖液 100mL
(ルート確保用)
→ 生食 100mL
デキサート注 6.6mg
→ 30分
200mL/h
→ 5%糖液 100mL
ゲムシタビン注
1250mg/㎡
→ 30分
200mL/h
→ 終了