診療科•対象疾患	呼吸器·乳腺外科·乳癌
プロトコール名	キイトルーダ+AC(D1)21d
1コース日数	21日
催吐リスク分類	高度

薬剤名	投与量	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				$\Box$
キイトルーダ注 ドキソルビシン注 エンドキサン注	200mg/body																									
ドキソルビシン注	60mg/ <b>m</b> i																									
エンドキサン注	600mg∕ <b>m</b> i̇́																									


## 治療スケジュール

処方

アプレピタントカプセル(125) 1C 1日1回 朝(day1) アプレピタントカプセル(80) 1C 1日1回 朝(day2、3) デカドロン錠(4) 2錠 1日1回 朝(day2、3、4、必要時day5) (必要時)オランザピン錠(2.5) 2錠 1日1回 夕(day1、2、3、4)


## ※ 投与の際はドリップアイを使用

- ※ アプレピタントカプセル125mg 1日1回抗がん剤投与開始1時間~1時間30分前
- ※ 4コース施行予定



**閉鎖式ルート使用** フィルター付ルート使用

※必ず別紙の「ケモセーフロック投与管理について」を参照の上、実施すること



## ケモセーフロック投与管理について

