診療科・対象疾患	呼吸器・乳腺外科・乳癌
プロトコール名	Weekly PAC＋フェスゴMA(2回目以降)21d
1コース日数	21日
催吐リスク分類	軽度

薬剤名	投与量	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
フェスゴMA	10mL/body	●																											
パクリタキセル注	80mg/㎡	●							●							●													

治療スケジュール

処方

レスタミン錠(10)　　5錠　1日1回　朝(day1、8、15)

※ 投与の際はドリップアイを使用

※ 大腿部に5分以上かけて皮下注射(2回目以降)；注射針25～27G推奨

※ 初回：IN製剤、2回目以降：MA製剤

※ 前回投与日から6週間以上のときには改めて初回投与量(フェスゴIN)を投与

Day1

生食 500mL
(ルート確保用)

→ フェスゴMA

→ 5分以上 皮下注 → 15分経過観察 →

レスタミン(10) 5錠
グラニセトロン点滴 3mg
デキサート注 6.6mg
ファモチジン注20mg

→ 15分 →

5%糖液 250mL
パクリタキセル注
80mg/㎡

→ 1時間 → 終了

フィルター付ルート使用

Day8、15

生食500mL
(ルート確保用)

→

レスタミン(10) 5錠
グラニセトロン点滴 3mg
デキサート注 6.6mg
ファモチジン注20mg

→ 15分 →

5%糖液 250mL
パクリタキセル注
80mg/㎡

→ 1時間 → 終了

フィルター付ルート使用