診療科・対象疾患	呼吸器・乳腺外科・乳癌
プロトコール名	Eribulin(D1, 8)＋パージェタ+HER(2回目以降)21d
1コース日数	21日
催吐リスク分類	軽度

薬剤名	投与量	day1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
パージェタ注	420mg/body	●																											
トラスツズマブ注	6mg/kg	●																											
ハラヴェン注	1.4mg/㎡	●							●																				

治療スケジュール

※ パージェタ注は前回投与から6週間以上のときには改めて初回投与量で行う
※ トラスツズマブ注は投与予定日より1週間を超えて投与する際は改めて初回投与量で行う
※ トラスツズマブ注の溶解液量は60mgが3.0mL、150mgが7.2mL

Day1

生食 100mL（ルート確保用） → 生食 250mL パージェタ注 420mg/body → 30分※ → 生食 50mL → 15分 → 生食 250mL トラスツズマブ注 6mg/kg → 30分※ → 生食 100mL デキサート注 6.6mg → 30分 →

※2回目以降、30分に変更可能　　※2回目以降、30分に変更可能

生食 50mL ハラヴェン注 1.4mg/㎡ → 全開 → 終了

Day8

生食 100mL（ルート確保用） → 生食 100mL デキサート注 6.6mg → 30分 → 生食 50mL ハラヴェン注 1.4mg/㎡ → 全開 → 終了